

こんな症状があったら

がんけんかすいしょう

眼瞼下垂症かもしれません。



まぶたが上がらず
視野が狭くなった



おでこに
シワが増えた



肩こりや片頭痛
がひどい



眼の疲れが
年々強くなっている

気になる症状がある方は 一度ご相談ください。

眼瞼下垂症は、まぶたの皮膚やまぶたを持ち上げる筋肉がゆるんで、下に下がり、モノが見えにくくなる疾患です。片目だけや両目共にの場合があります。

視野が狭いことの他に、常に眠そうな印象を与え、眉毛を上げて視野を広げようとする事で、おでこには深いシワが刻まれます。また、無意識にまぶたをあげようとする状態が続くため、**高血圧**になったり、**肩こり・頭痛・眼精疲労**につながる方もいます。

まぶたを持ち上げる眼瞼挙筋を縫い縮める手術により、まぶたを上げやすくします。手術は局所麻酔で約1～2時間です。術後はまぶたが腫れるため、腫れがある程度落ち着くまでは入院をお勧めしておりますが、ご希望があれば日帰り手術も可能です。眼瞼下垂症は**保険適応**されますので、お気軽にご相談ください。



正常な目



くぼみ目や
眠そうな目



目尻が下がった
三角目

形成外科 部長/美容外科 部長
徳島大学名誉教授・客員教授

中西秀樹

日本形成外科学会 (名誉会員・元理事長)
日本形成外科学会 指導医・専門医

■ 眼瞼下垂専門外来

	月	火	水	木	金	土
午前	-	中西秀樹 (10時 ~12時)	-	-	-	-

※紹介状がなくても受診は可能です。ただし、選定療養費(税込4,000円)がかかります。予めご了承ください。

いきるを支える。

HITO

病院

お問い合わせ

【月～金】 8:30～17:00
【第1・3土】 8:30～12:00

サポートセンターご予約専用TEL

0896-58-2226

〒799-0121 愛媛県四国中央市上分町788-1